



Malteser

...weil Nähe zählt.

Patienteninformation Entfernung der Gallenblase

Malteser Krankenhaus
St. Hildegardis

Klinik für Allgemein-
und Viszeralchirurgie,
Minimalinvasive
Chirurgie

Chefarzt
PD Dr. med.
Marcus Overhaus

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie sind wegen einer *Erkrankung der Gallenblase* im laparoskopischen Verfahren operiert worden. Zum besseren Verständnis der damit verbundenen Umstände und der nach der Operation notwendigen Weiterbehandlung möchten wir Ihnen nachfolgend einige Zusammenhänge erklären:

- Die Gallenblase ist das Speicherorgan der Gallenflüssigkeit, die in der Leber produziert wird. Auf die Gallenblase kann verzichtet werden. Die Gallenflüssigkeit, die zur Zersetzung der Nahrungsbestandteile notwendig ist, wird weiterhin von der Leber produziert. Der Körper passt sich nach der Operation an die neue Situation an.
- Die kleinen für die Operation notwendigen Öffnungen verschließen wir üblicherweise mit selbstauflösendem Faden.
- Zu einem guten Heilerfolg können Sie wesentlich beitragen, indem Sie folgende Dinge beachten:
 - 1) Duschen ist sofort erlaubt. Nach dem Duschen muss das Pflaster gewechselt werden.
 - 2) Je nach beruflicher Tätigkeit sind Sie noch 1–2 Wochen nach Entlassung arbeitsunfähig. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit legt Ihr nachbehandelnder Arzt oder Hausarzt fest.
 - 3) Körperliche Belastung wie schweres Tragen von Lasten über 5 kg sollten Sie 2-3 Wochen nach der Operation vermeiden.
 - 4) Den Wundschmerz empfindet jeder Patient anders. Prinzipiell raten wir bis 1 Woche nach der Operation zu einer regelmäßigen Einnahme der empfohlenen Schmerzmedikation, um chronische Schmerzen zu vermeiden.
 - 5) Sie dürfen Auto fahren, sobald Sie beschwerdefrei sind. Dies ist individuell. Bedenken Sie aber, dass scharfes Bremsen Schmerzen verursachen kann, was zu einer gefährlichen Reaktionsminderung führen kann.
 - 6) Verschiedene Sportarten belasten die Narbenregion unterschiedlich stark, so dass wir folgende Empfehlung aussprechen: leichte Sportarten wie Wandern oder Walken sofort nach der Operation; Sportarten wie Radfahren, Joggen, Fußball mit Belastung der Bauchmuskulatur ab der 3. Woche nach der Operation.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Merkblatt hilfreiche Informationen mitzugeben.

Für weitere Fragen stehen wir und Ihr behandelnder Arzt Ihnen jederzeit zur Verfügung.

*Ihr Team der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Minimalinvasive Chirurgie
am Malteser Krankenhaus St. Hildegardis*